



56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ Butmir

Sarajevo, 14.05.2016. godine



56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Osma osnovna škola «Amer Ćenanović» Butmir
Sarajevo, 14.05.2016. godine

Program takmičenja

08:30 – 09:30	prijem i registracija takmičara
09:30 – 09:50	svečano otvaranje takmičenja (obraćanje domaćina, organizatora i pokrovitelja)
09:50 – 10:00	raspoređivanje takmičara po učionicama
10:00 – 13:00	izrada zadataka
10:30 – 11:30	okrugli sto za nastavnike i pratioce učenika
13:00 – 16:00	pregledanje radova
16:00 – 16:45	preliminarni rezultati i žalbe
16:45 – 17:00	pisanje diploma
17:00	proglašenje pobjednika i učenika koji su se plasirali na Juniorsku matematičku olimpijadu Bosne i Hercegovine



Općina Iližda, površine je 162 km^2 , zauzima centralni dio Kantona Sarajevo, sa pravcem pružanja sjeverozapad- jugoistok.

Rijetko gdje u ovom podneblju je ostvarena prirodna harmonija kao što je na iliždanskom prostoru. Idući od najnižih dijelova Sarajevskog polja, Vrele Bosne i Butmira, uz zanosne planine Igman i Bjelašnicu, zakonito se smjenjuju različiti zonalni i azonalni sistemi. Planina Igman čini prirodni amfiteatar ovog područja.

Iližda nije poznata samo po svojim poljima, hladnom i svježem Igmanu, Vrelu Bosne, već je mnogo više po svojim nadaleko čuvenim termalnim izvorištima (iližama), od kojih su mnoge sačuvane i danas. Još u rimsko doba izgrađena su banjska lječilišta. Zbog toga se ovo rimsko naselje, na lokalitetu današnje općine Iližda, smatra začetkom razvoja urbanog sistema Sarajeva.

Danas su veoma važna dva strateška cilja razvoja općine Iližda, sa naglašenim ubrzanim ekonomskim razvojem i unapređenje konkurentnosti privrede, sa posebnim naglaskom na razvoj turizma i kreativne ekonomije, kao i pozicioniranje Iližde kao vrhunskog univerzitetskog i zdravstveno-rehabilitacionog centra.



Iličići je jedna od devet sarajevskih općina, ali i najstarije naseljeno područje Sarajeva. O tome nam svjedoči Butmirska kultura.

Butmir je svakako najpoznatiji po Butmirskoj kulturi (nastala oko 5100. godine p. n. e.), jednoj od najznačajnijih kulturnih grupa iz mlađeg neolitskog perioda u Evropi. Nalazište ove kulture je učinilo Bosnu i Hercegovinu poznatu u svjetskim znanstvenim krugovim.

Ovo naselje je poznato po izgradnji prvog hipodroma u Bosni i Hercegovini, tokom perioda austro-ugarske vladavine. U nešto bližoj prošlosti veoma značajan na ovom prostoru je Tunel spasa koji je poznat po tome što je hranio Sarajlije tokom ratnih godina.

Ono što je za nas posebno važno je rekonstrukcija stare područne škole i izgradnja nove, moderne škole koja počinje sa radom u septembru 2000. godine na čelu sa prvim direktorom, rahmetli gospodinom Amerom Ćenanovićem. 2011. godine Skupština Kantona Sarajevo podržala je inicijativu građana i uposlenika da škola nosi naziv po ovom velikom čovjeku i škola od tada nosi ime Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“.



U prethodnom periodu škola je funkcionalisala kao područna škola u okviru Osnovne škole „Branko Radičević“ Ilijada, u toku agresije egzistira kao Osnovna škola „Butmir“, poslije reintegracije općine Ilijada kao područna škola Prve osnovne škole Ilijada.

Tokom proteklih šesnaest godina škola u svom radu bilježi značajne uspjehe kako na općinskim tako i na kantonalnim, ali i federalnim takmičenjima.





56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Sarajevo, 14.05.2016. godine

Z A D A C I

VII/9 i VI/8 razred

Zadatak 1 Odrediti nepoznate cifre a i b tako da je broj $\overline{a783b}$ djeljiv sa 56.

Zadatak 2 Koji je od razlomaka $\frac{5553}{5557}$, $\frac{6664}{6669}$ veći?

Zadatak 3 Od tri mladića i tri djevojke svaki mladić poznaje tačno dvije djevojke i svaka djevojka tačno dva mladića. Dokazati da se djevojke i mladići mogu surstati u parove tako da se u svakom paru nađu poznanici.

Zadatak 4 Neka su C i D tačke u unutrašnjosti ugla $\angle AOB$ takve da vrijedi: $5m(\angle COD) = 4m(\angle AOC)$ i $3m(\angle COD) = 2m(\angle DOB)$. Ako je $m(\angle AOB) = 105^0$, odrediti $m(\angle COD)$.

Zadatak 5 Stranice jedne knjige su numerisane brojevima od 1 do 100. Iz knjige je istrgnuto nekoliko listova i pri tome se pokazalo da je zbir brojeva kojima su te strane numerisane jednak 4949. Koliko listova je istrgnuto?

- Svaki zadatak je vrednovan sa 10 poena.
- U toku rada nije dozvoljeno izlaženje iz učionice niti korištenje digitrona i mobitela.
- Vrijeme za rad je 180 minuta.



56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Sarajevo, 14.05.2016. godine

Z A D A C I

VIII/9 i VII/8 razred

Zadatak 1 Jedno preduzeće iz Tešnja je u prošloj godini ispunilo plan proizvodnje sa 112%. Izračunati koliko procenata ostvarene proizvodnje predstavlja planirana.

Zadatak 2 Ako je

$$w = \sqrt{1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}} - \sqrt{1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}},$$

dokazati da je $w = \sqrt{3} - 1$.

Zadatak 3 Dokazati da se pri dijeljenju prostog broja sa 30 dobija ostatak koji nije složen broj.

Zadatak 4 U pravouglom trouglu ABC tačka D je sredina hipotenuze, a E i F su tačke na katetama AC i BC respektivno takve da je $DE \perp DF$. Dokazati da je $|EF|^2 = |AE|^2 + |BF|^2$.

Zadatak 5 U tablici

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

je zaokruženo 10 brojeva, i to u svakom redu i svakom stupcu po jedan. Dokazati da su među njima bar dva jednakna.

- Svaki zadatak je vrednovan sa 10 poena.
- U toku rada nije dozvoljeno izlaženje iz učionice niti korištenje digitrona i mobitela.
- Vrijeme za rad je 180 minuta.



56. TAKMIČENJE MLADIH MATEMATIČARA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO PRVENSTVO UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Sarajevo, 14.05.2016. godine

Z A D A C I

IX/9 i VIII/8 razred

Zadatak 1 Ako je $a > b > c$, dokazati da je

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} > \frac{2}{a-c}.$$

Zadatak 2 Naći skup prirodnih brojeva djeljivih sa osam čiji je zbir cifara u dekadnom sistemu 7, a proizvod 6.

Zadatak 3 U trapezu $ABCD$, vrijedi $AD \parallel BC$, $m(\angle ABC) = 30^\circ$, $m(\angle BCD) = 60^\circ$ i $|BC| = 7$. Neka su E, M, F, N sredina stranica \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} i \overline{DA} . Ako je $|MN| = 3$, izračunati $|EF|$.

Zadatak 4 U skupu prirodnih brojeva riješiti jednačinu

$$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 = 8(x^2 + xy + y^2 + 1).$$

Zadatak 5 605 kugli jednakog poluprečnika je podijeljeno na dva dijela. Od jednog dijela je napravljena "uspravna piramida" kojoj je baza kvadrat, a od drugog dijela je napravljena "uspravna piramida" kojoj je baza jednakost-traničan trougao. Obje "piramide" su u visinu složene od jednakog broja redova kugli. Odrediti broj kugli u svakoj "piramidi".

- Svaki zadatak je vrednovan sa 10 poena.
- U toku rada nije dozvoljeno izlaženje iz učionice niti korištenje digitrona i mobitela.
- Vrijeme za rad je 180 minuta.

Rješenje zadataka

VII/9 i VI/8 razred

Zadatak 1. Odrediti nepoznate cifre a i b tako da je broj $\overline{a783b}$ djeljiv sa 56.

Rješenje. Kako je $56 = 7 \cdot 8$ i $\text{nzd}(7, 8) = 1$, to je dovoljno odrediti cifre a i b tako da $7 | x$ i $8 | x$. Neka je $x = a783b$. Kako je $x = 10000a + 7800 + \overline{3b}$ i $8 | (10000a + 7800)$, to iz $8 | x$ slijedi $8 | \overline{3b}$. Odavde slijedi $b = 2$.

Broj x možemo napisati u obliku $x = 1000a + 7832$. Nadalje, imamo $10000a = 7 \cdot 1428a + 4a$ i $7832 = 7 \cdot 1118 + 6$, pa je $x = 7(1428a + 1118) + 4a + 6$. Odavde slijedi $7 | x$, ako i samo ako $7 | (4a + 6)$. Kako je $10 \leq 4a + 6 \leq 42$, $7 | (4a + 6)$ i $4a + 6$ je paran broj, to je $4a + 6 \in \{14, 28, 42\}$, tj. $2a + 3 \in \{7, 14, 21\}$. Odavde slijedi $a = 2$ ili $a = 9$.

Prema tome $(a, b) \in \{(2, 2), (9, 2)\}$. \diamond

Zadatak 2. Koji je od razlomaka $\frac{5553}{5557}, \frac{6664}{6669}$ veći?

Rješenje. Ako se prvi razlomak napiše u obliku $A = \frac{a-4}{a}$, a drugi u obliku $B = \frac{b-5}{b}$, tada je njihova razlika $A - B = \frac{5a-4b}{ab}$. Pošto je $5a = 27785$ i $4b = 26676$, vidi se da je $5a - 4b > 0$, pa je $A - B > 0$, tj. $A > B$. \diamond

Zadatak 3. Od tri mladića i tri djevojke svaki mladić poznao je tačno dvije djevojke i svaka djevojka tačno dva mladića. Dokazati da se djevojke i mladići mogu svrstati u parove tako da se u svakom paru nađu poznanici.


Rješenje. Označimo djevojke sa D_1, D_2 i D_3 , a mladiće sa M_1, M_2 i M_3 . Prema prepostavci zadatka ne može se desiti da dvije djevojke poznaju dva mladića i ti isti mladići poznaju te dvije djevojke, jer bi u tom slučaju trećeg mladića poznavala samo jedna djevojka. Prepostavimo da djevojka D_1 poznao mladiće M_1 i M_2 . Formirajmo prvi par poznanika (D_1, M_1) . Kako djevojka D_2 poznao dva mladića, to ona sigurno poznao jednog od mladića M_2 i M_3 . Formirajmo par (D_2, M_2) . Ako se djevojka D_3 i mladić M_2 poznao, onda je ih možemo posmatrati kao treći par. Ako se nepoznaju, to znači da djevojka D_3 poznao mladiće M_1 i M_2 , a mladić D_3 poznao djevojke D_1 i D_2 , jer ne poznao mladića M_3 . Tada rasparimo drugi par i posmatramo parove (D_2, M_3) i (D_3, M_2) . Ovom podjelom u parove vidimo da smo ispunili uslove zadataka. \diamond

Zadatak 4. Neka su C i D tačke u unutrašnjosti ugla $\angle AOB$ takve da vrijedi: $5m(\angle COD) = 4m(\angle AOC)$ i $3m(\angle COD) = 2m(\angle DOB)$. Ako je $m(\angle AOB) = 105^0$, odrediti $m(\angle COD)$.

Rješenje. Poluprave OC i OD se nalaze u unutrašnjosti ugla $\angle AOB$, pa je bitno da znamo koja od ovih polupravi je "bliža" polupravoj OA . Zbog toga razmatramo dva slučaja:

- a) poluprava OC leži u unutrašnjosti ugla $\angle AOD$,
- b) poluprava OD leži u unutrašnjosti ugla $\angle AOC$.
- a) Neka OC leži u unutrašnjosti ugla $\angle AOD$. Stavimo:

$$m(\angle AOC) = x, \quad m(\angle COD) = y \quad \text{i} \quad m(\angle DOB) = z.$$



Tada je $5y = 4x$, $3y = 2z$ i $x + y + z = 105^\circ$. Pomnožimo li posljednju jednačinu sa 4 imaćemo $4x + 4y + 4z = 420^\circ$, odnosno $5y + 4y + 6y = 420^\circ$, tj. $15y = 420^\circ$. Dakle, $y = 28^\circ$, $x = 35^\circ$ i $z = 42^\circ$. Dakle, $m(\angle COD) = y = 28^\circ$.

b) Neka poluprava OD leži u unutrašnjosti $\angle AOC$. Stavimo $m(\angle AOD) = u$, $m(\angle DOC) = v$ i $\angle COB = w$. Na osnovu datih uslova u zadatku imamo: $5v = 4(u + v)$, $3v = 2(v + w)$ i $u + v + w = 105^\circ$. Odavde slijedi $v = 4u$ i $v = 2w$. Tada je $w = 2u$ i $v = 4u$. Na osnovu toga iz $u + v + w = 105^\circ$ slijedi $u = 15^\circ$, $v = 60^\circ$ i $w = 30^\circ$. Dakle, $m(\angle COD) = v = 60^\circ$. \diamond

Zadatak 5. Stranice jedne knjige su numerisane brojevima od 1 do 100. Iz knjige je istrgnuto nekoliko listova i pri tome se pokazalo da je zbir brojeva kojima su te strane numerisane jednak 4949. Koliko listova je istrgnuto?

Rješenje. Kako je svaki list numerisan brojevima $2n - 1$ (s jedne strane) i $2n$ (s druge strane), to je zbir brojeva na svakom listu jednak $4n - 1$, gdje je $1 \leq n \leq 50$. Neka je preostalo k neistrgnutih listova. Tada je zbir brojeva kojima su numerisane te stranice jednak

$$(4n_1 - 1) + (4n_2 - 1) + \cdots + (4n_k - 1) = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100) - 4949,$$

tj.

$$4(n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k) - k = 101.$$

Kako je ostatak pri dijeljenju broja 101 sa 4 jednak 1, to i ostatak pri dijeljenju broja $4(n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k) - k$ sa 4 mora biti jednak 1. Kako je $4(n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k)$ djeljivo sa 4, to ostatak pri dijeljenju broja $-k$ sa 4 mora biti jednak 1, tj. ostatak pri dijeljenju broja k s 4 mora biti jednak 3. Zaključujemo da je

$$k \in \{3, 7, 11, 15, \dots, 87, 91, 95, 99\}.$$

Kako je za $k \geq 7$

$$4(n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k) - k \geq 4(1 + 2 + \dots + 7) - 7 = 105 > 101,$$

to slijedi da je jedino moguće rješenje $k = 3$, pa zaključujemo da je istrgnuto $50 - 3 = 47$ listova. \diamond

Rješenje zadataka

VIII/9 i VII/8 razred

Zadatak 1. Jedno preduzeće iz Tešnja je u prošloj godini ispunilo plan proizvodnje sa 112%. Izračunati koliko procenata ostvarene proizvodnje predstavlja planirana.

Rješenje. Neka je a planirana proizvodnja, a b ostvarena proizvodnja. Tada je

$$b = \frac{a \cdot 112}{100} = \frac{28}{25}a.$$

Neka je p traženi procenat. Tada je $a = \frac{b \cdot p}{100}$. Odavde je

$$p = \frac{100a}{b} = \frac{100a}{\frac{28}{25} \cdot a} = \frac{2500}{28} = \frac{625}{7} = 89,29\%.$$

◇

Zadatak 2. Ako je

$$w = \sqrt{1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}} - \sqrt{1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}},$$

dokazati da je $w = \sqrt{3} - 1$.

Rješenje. Kako je $\sqrt{1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}} > \sqrt{1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}}$, to je $w > 0$.

Stavimo $a = \sqrt{1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}}$ i $b = \sqrt{1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}}$. Tada je

$$a^2 = 1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}$$

i

$$b^2 = 1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}},$$

pa je $a^2 + b^2 = 2$.

S druge strane imamo

$$\begin{aligned} ab &= \sqrt{\left(1 + \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}\right) \cdot \left(1 - \sqrt{-3 + 2\sqrt{3}}\right)} \\ &= \sqrt{1 - (-3 + 2\sqrt{3})} = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} = |\sqrt{3} - 1| = \sqrt{3} - 1. \end{aligned}$$

Kako je $w = a - b$ i $w^2 = (a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$, to je

$$w^2 = 2 - 2(\sqrt{3} - 1) = 4 - 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2,$$

pa je $w = |w| = \sqrt{w^2} = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{3} - 1$. \diamond

Zadatak 3. Dokazati da se pri dijeljenju prostog broja sa 30 dobija ostatak koji je prost broj.


Rješenje. Neka se pri djeljenju prostog broja p brojem 30 dobija količnik a i ostatak r . Tada je $0 \leq r < 30$. Ako bi bilo $r = 0$, onda bi prost broj p bio djeljiv brojem 30, što je u suprotnosti sa pretpostavkom da je p prost broj. Trebamo dokazati da je r prost broj. Pretpostavimo suprotno, tj. da je r složen broj. Svaki složen broj manji od 30 ima kao prosti faktori bar jedan od brojeva: 2, 3 i 5. Naime, svaki parni broj ima prosti faktor 2. Neparni složeni brojevi manji od 30 su: 9, 15, 21, 25 i 27. Oni imaju bar jedan prosti faktor 3 ili 5. To znači da r i 30 imaju bar jedan zajednički prosti faktor. Neka je taj faktor q . Tada je $30 = qb$ i $r = qc$, gdje su b i c prirodni brojevi. Tako imamo

$$p = 30a + r = qab + qc = q(ab + c),$$

tj. $q | p$, što je nemoguće, jer je p prost broj. Pretpostavka da ostatak nije prost broj dovela nas je do kontradikcije, pa nije tačna. Dakle, ostatak je prost broj. \diamond

Zadatak 4. U pravouglom trouglu ABC tačka D je sredina hipotenuze, a E i F su tačke na katetama AC i BD respektivno takve da je $DE \perp DF$. Dokazati da je $|EF|^2 = |AE|^2 + |BF|^2$.

Rješenje. Kroz tačku A povucimo paralelu sa BC . Neka prava FD siječe ovu paralelu u tački G .



Trouglovi BDF i ADG su podudarni, jer je $|AD| = |BD|$, $m(\angle DAG) = m(\angle DBF)$ kao naizmjenični uglovi i $m(\angle ADG) = m(\angle BDF)$ kao unakrsni uglovi. Iz ove podudarnosti slijedi $|DG| = |DF|$. Posmatrajmo sada pravougle trouglove EDF i EDG . Vrijedi $|DG| = |DF|$, $|ED| = |ED|$ i $m(\angle EDF) = m(\angle EDG) = 90^\circ$. Na osnovu pravila SUS ovi trouglovi su podudarni, pa je $|EG| = |EF|$.

Tada je $|EF|^2 = |EG|^2$. Primjenom Pitagorine teoreme na trougao EGA dobije se $|EG|^2 = |AG|^2 + |AE|^2 = |AE|^2 + |BF|^2$. Dakle, $|EF|^2 = |AE|^2 + |BF|^2$, što je i trebalo dokazati. \diamond

Zadatak 5. U tablici

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

je zaokruženo 10 brojeva, i to u svakom redu i svakom stupcu po jedan.
Dokazati da su među njima bar dva jednakaka.

Rješenje. Uočimo da je svaki broj u tablici jednak ostatku koji nastaje pri dijeljenju zbiru prvog broja u redu i prvog broja u stupcu gdje se nalazi posmatrani broj. To znači da je ostatak pri dijeljenju zbiru svih zaokruženih brojeva s 10 jednak ostatku pri dijeljenju zbiru ((zbir brojeva u prvom redu) + (zbir brojeva u prvom stupcu))

$$(0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)+(0+9+8+7+6+5+4+3+2+1) = 45+45 = 90$$

sa 10, a to je 0.

Međutim, kada bi svi zaokruženi brojevi bili različiti, onda bi njihov zbir bio jednak

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45,$$

pa bi ostatak pri dijeljenju s 10 bio 5. To znači da ne mogu svi zaokruženi brojevi biti različiti. \diamond

Rješenje zadataka

IX/9 i VIII/8 razred

Zadatak 1. Ako je $a > b > c$, dokazati da

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} > \frac{2}{a-c}.$$

Rješenje. Kako je $a > b > c$, to je

$$a - c > a - b > 0, \quad a - c > b - c > 0.$$

Tada je $\frac{a-c}{a-b} > 1$ i $\frac{a-c}{b-c} > 1$. Sabiranjem ove dvije nejednakosti dobije se

$$\frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} > 2.$$

Dijeljenjem posljednje nejednakosti pozitivnim realnim brojem $a - c$ dobije se

$$\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} > \frac{2}{a-c},$$

što je i trebalo dokazati.

Drugo rješenje. Kako je $a > b > c$, to postoje pozitivni realni brojevi x i y takvi da je $a - b = x$ i $b - c = y$. Sabiranjem ovih jednakosti dobije se $a - c = x + y$.

Stavimo $w = \frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} - \frac{2}{a-c}$. Trebamo pokazati da je $w > 0$. Odavde imamo

$$w = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{x+y} = \frac{x(x+y) + y(x+y) - 2xy}{xy(x+y)} = \frac{x^2 + y^2}{xy(x+y)} > 0.$$

Što je i trebalo dokazati.

Treće rješenje Stavimo $w = \frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} - \frac{2}{a-c}$. Nakon sruđenja na isti nazivnik i sređivanja dobije se

$$w = \frac{a^2 + 2b^2 + c^2 - 2ab - 2bc}{(a-b)(b-c)(a-c)} = \frac{(a-b)^2(b-c)^2}{(a-b)(b-c)(a-c)} > 0,$$

što je i trebalo dokazati. \diamond

Zadatak 2. Naći skup prirodnih brojeva djeljivih sa osam čiji je zbir cifara u dekadnom sistemu 7, a proizvod 6.

Rješenje. Pošto je traženi broj djeljiv sa 8, on mora da bude paran. Proizvod cifara traženog broja je 6, pa je svaka cifra tog broja faktor broja 6. To znači da decimalne cifre traženog broja pripadaju skupu $\{1, 2, 3, 6\}$. Kako je traženi broj djeljiv sa 8, to je on paran, pa se završava parnom cifrom. Dakle, cifra jedinica je 2 ili 6.

Ako je cifra jedinica 6, onda zbir preostalih cifara traženog broja je $7 - 6 = 1$. Prema tome, traženi broj je 16.


Neka je cifra jedinica 2. Kako je proizvod svih cifara 6, to je proizvod preostalih cifara 3. Tako smo dobili da traženi broj ima cifre 2, 3, 1, 1, jer je zbir svih cifara 7. Imamo ove mogućnosti: 1132, 1312 i 3112. Uslov da je traženi broj djeljiv sa 8 zadovoljavaju brojevi: 1312 i 3112.

Traženi skup brojeva je $\{16, 1312, 3112\}$. \diamond

Zadatak 3. U trapezu $ABCD$, vrijedi $AD \parallel BC$, $m(\angle ABC) = 30^\circ$, $m(\angle BCD) = 60^\circ$ i $|BC| = 7$. Neka su E, M, F, N sredina stranica \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} i \overline{DA} . Ako je $|MN| = 3$, izračunati $|EF|$.

Rješenje. \overline{EF} je srednja linija trapeza, pa je $|EF| = \frac{1}{2}(|BC| + |AD|)$. Kako je $|BC| = 7$, to je neophodno da izračunamo $|AD|$.

Kroz tačku N povucimo paralele sa AB i DC . Neka ove paralele sijeku \overline{BC} u tačkama G i H . Četverouglovi $ABGN$ i $CDNH$ imaju dva para paralelnih stranica, pa su paralelogrami. Zbog toga je $|BG| = |NA| = |ND| = |CH|$. Kako je $|CM| = |MB|$ i $|CH| = |GB|$, to je $|HM| = |MG|$. Dakle, M je sredina duži \overline{GH} .



Kako je NH paralelno sa DC , to je $m(\angle NHG) = m(\angle DCB) = 60^\circ$. Isto tako iz $NG \parallel AB$ slijedi $m(\angle NGH) = m(\angle ABC) = 30^\circ$. Zbog toga je trougao NGH pravougli trougao sa pravim ugлом u tjemenu N . Nadalje, \overline{NM} je težišna linija pravouglog trougla NGH koja odgovara hipotenuzi, pa je $|NM| = \frac{1}{2}|GH|$. Odavde je $|GH| = 2|MN| = 2 \cdot 3 = 6$. Kako je $|AD| = |HC| + |BG|$, to je $|AD| = |BC| - |HG| = 7 - 6 = 1$. Konačno imamo $|EF| = \frac{1}{2}(7 + 1) = 4$. \diamond

Zadatak 4. U skupu prirodnih brojeva riješiti jednačinu

$$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 = 8(x^2 + xy + y^2 + 1).$$

Rješenje. Vidimo da je jednačina simetrična po x i y , pa se može zapisati u ekvivalentnom obliku

$$((x+y)^2 - 2xy)(x+y) = 8((x+y)^2 - xy + 1),$$

koji uz uvođenje supstitucije $x+y = u$ i $xy = v$ postaje

$$u(u^2 - 2v) = 8(u^2 - v + 1).$$

Zaključujemo da u mora biti paran, tj. $u = 2t$, $t \in \mathbb{N}$. Sada posljednja jednačina prelazi u oblik

$$2t^3 - tv = 8t^2 - 2v + 2,$$

koja je linearna po v , pa dobijamo

$$v = 2t^2 - 4t - 8 - \frac{18}{t-2}, \quad t \neq 2.$$

Da bi rješenja bila cjelobrojna, $t-2$ mora biti djelitelj broja 18, tj.

$$t-2 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18\} \Rightarrow t \in \{-16, -7, -4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 8, 11, 20\}.$$

Kako t mora biti prirodan broj, to dobijamo

$$t \in \{1, 3, 4, 5, 8, 11, 20\}.$$

Uvrštavajući dobijene vrijednosti dobijamo

t	1	3	4	5	8	11	20
u	2	6	8	10	16	22	40
v	8	-20	-1	16	85	188	711

Rješenja za x i y , iz skupa prirodnih brojeva, se dobiju jedino za $(t, u, v) = (5, 10, 16)$, i to $(x, y) \in \{(2, 8), (8, 2)\}$.

Još ostaje pronaći rješenja za $t = 2$. Tada je $u = 4$. Uvrstimo li to u jednačinu $u(u^2 - 2v) = 8(u^2 - v + 1)$, dobijamo je $64 = 120$, pa vidimo da ona nema rješenja.

Na kraju zaključujemo da polazna jednačina ima samo dva rješenja u skupu prirodnih brojeva i to

$$(x, y) \in \{(2, 8), (8, 2)\}.$$

◊

Zadatak 5. 605 kugli jednakog poluprečnika je podijeljeno na dva dijela. Od jednog dijela je napravljena "uspravna piramida" kojoj je baza kvadrat, a od drugog dijela je napravljena "uspravna piramida" kojoj je baza jednakostraničan trougao. Obje "piramide" su u visinu složene od jednakog broja redova kugli. Odrediti broj kugli u svakoj "piramidi".

Rješenje. Označimo broj redova kugli s n . Na vrhu četverostrane piramide je jedna kugla. U pretposljednjem redu (drugom od vrha) su 4 kugle, u sljedećem je 9 kugli, itd. U prvom redu (u bazi) je n^2 kugli. Označimo li sa S_4 broj kugli u četverostranoj piramidi, onda imamo da vrijedi:

$$S_4 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2.$$

Na vrhu trostrane piramide je jedna kugla. U pretposljednjem redu (drugom od vrha) su $1 + 2 = 3$ kugle, u sljedećem je $1 + 2 + 3 = 6$ kugli, itd. U prvom redu (u bazi) je $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n+1)/2$ kugli. Označimo li sa S_3 broj kugli u trostranoj piramidi, onda imamo da vrijedi:

$$\begin{aligned} S_3 &= 1 + (1+2) + (1+2+3) + \cdots + (1+2+3+\cdots+n) \\ &= n \cdot 1 + (n-1) \cdot 2 + (n-2) \cdot 3 + \cdots + [n - (n-1)] \cdot n \\ &= n + 2n + 3n + \cdots + n \cdot n - [1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + (n-1) \cdot n] \\ &= n(1+2+3+\cdots+n) - \\ &\quad - [1 \cdot (1+1) + 2 \cdot (2+1) + 3 \cdot (3+1) + \cdots + (n-1)((n-1)+1)] \\ &= n \cdot \frac{n(n+1)}{2} - [1^2 + 1 + 2^2 + 2 + 3^2 + 3 + \cdots + (n-1)^2 + (n-1)] \\ &= \frac{n^2(n+1)}{2} - [1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (n-1)^2 + n^2] + \\ &\quad + n^2 - [1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1)] \\ &= \frac{n^2(n+1)}{2} - S_4 + n^2 - \frac{(n-1) \cdot n}{2}. \end{aligned}$$

Dobili smo da je

$$S_3 + S_4 = \frac{n^2(n+1)}{2} + n^2 - \frac{(n-1) \cdot n}{2},$$

a kako je $S_3 + S_4 = 605$, to imamo jednačinu

$$\frac{n^2(n+1)}{2} + n^2 - \frac{(n-1) \cdot n}{2} = 605,$$

koja nakon sređivanja glasi

$$n(n+1)^2 = 1210.$$

Kako je

$$1210 = 2 \cdot 5 \cdot 11^2,$$

to imamo da je

$$n(n+1)^2 = 10 \cdot 11^2,$$

pa je rješenje jednačine (u skupu prirodnih brojeva) $n = 10$.

Sada je lako odrediti broj kugli u svakoj od piramida, i dobijamo da je

$$S_4 = 385 \quad \text{i} \quad S_3 = 220.$$

◇

56. Takmičenje mladih matematičara Bosne i Hercegovine
Federalno prvenstvo učenika osnovnih škola

Konačni rezultati za VII/9 i VI/8 razred

Plasman	Prezime i ime	Škola	1	2	3	4	5	Suma
1	Hodžić Alen	O.Š. Ključ, Ključ	9	10	6	10	2	37
2	Imamović Haris	Čengić Vila 1, Sarajevo	6	10	0	10	3	29
3	Strujić Jasmina	Čengić Vila 1, Sarajevo	9	10	0	6	3	28
3	Softić Ahmed	Travnik, Travnik	9	10	0	6	3	28
5	Alibašić Imana	Aleksa Šantić, Sarajevo	7	10	0	6	4	27
5	Stanković Boris	Safvet beg Bašagić, Visoko	9	10	0	6	2	27
7	Bašić Faruk	Husein ef. Đozo Goražde	8	10	0	6	2	26
7	Purišević Naida	Safvet beg Bašagić Visoko	7	10	0	6	3	26
7	Jovanović Ena	Meša Selimović, Zenica	10	10	0	6	0	26
10	Škrgić Dado	Ćoralići, Cazin	5	10	2	6	2	25
10	Hujić Adi	Musa Ćazim Ćatuć, Sarajevo	9	10	0	6	0	25
12	Mulahmetović Mirza	Zahid Baručija	6	10	0	6	2	24
12	Rakovac Kanita	Kalesija, Kalesija	6	10	0	6	2	24
14	Kurbegović Adin	Prva osnovna škola, Bugojno	6	10	0	6	0	22
14	Hadžimušović Sibel	M. Mak Dizdar, Sarajevo	6	10	0	6	0	22
16	Jagodić Belma	Brčanska Malta, Tuzla	9	10	0	0	2	21
16	Mazalović Aida	Jala, Tuzla	5	10	0	6	0	21
18	Silajdžić Osman	Safvet beg Bašagić, Breza	7	10	0	1	2	20
19	Kasumović Azra	Novi grad, Tuzla	6	10	0	1	2	19
19	Hadžović Namik	Musa Ćazim Ćatuć, Sarajevo	9	1	1	6	2	19
21	Osmanović Nermin	Zahid Baručija	4	10	1	2	0	17
22	Kurtović Esma	Čengić Vila 1, Sarajevo	6	2	0	6	2	16
23	Šehovac Anja	KŠC Sveti Josip Sarajevo	3	2	0	6	3	14
24	Galijašević Adnan	Sead Čehić, V. Kladuša	7	2	0	1	3	13
25	Živojević Edin	Husein ef. Đozo Goražde	3	5	0	2	2	12
25	Omerović Ejna	Lukavac grad, Lukavac	9	2	0	1	0	12
27	Ahmetašević Lamija	Safvet beg Bašagić Gradačac	3	2	0	6	0	11
27	Dautbegović Sara	KŠC Sveti Pavao Zenica	3	0	0	6	2	11
29	Merdijija Zarean	Đulistan Lješevo, Ilijaš	5	2	0	1	2	10
29	Bristrić Emina	Safvet beg Bašagić	2	5	0	1	2	10
31	Herceglijia Ajša	Kulin Ban, Visoko	3	2	0	1	2	8
32	Bećić Medina	Đulistan Lješevo, Ilijaš	3	0	0	2	2	7
32	Petrović Dario	Pazar, Tuzla	4	1	0	2	0	7
34	Kolaković Hasib	Stijena Cazin	0	2	0	1	2	5
35	Braković Lejla	Rešad Kadić Tešanj	1	1	0	1	1	4
36	Halilović Sumeja	Travnik, Travnik	1	2	0	0	0	3
37	Klisura Ismihana	Mehurići, Travnik	0	1	0	1	0	2
37	Rustempašić Sara	Treća osnovna škola, Bugojno	0	1	0	1	0	2
39	Horozović Azra	Treća osnovna škola, Bugojno	0	0	0	1	0	1

Konačni rezultati za VIII/9 i VII/8 razred

Plasman	Prezime i ime	Škola	1	2	3	4	5	Suma
1	Mehanović Adna	OŠ Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac	10	9	10	2	0	31
2	Čaušević Ajdin	Prva osnovna škola Velika Kladuša	10	5	9	1	0	25
2	Osmić Asja	OŠ Pazar	10	9	1	2	3	25
2	Alagić Azra	OŠ Skender Kulenović Sarajevo	10	0	10	2	3	25
5	Paradžik Sandro	OŠ Čengić Vila 1	8	9	1	3	2	23
6	Kasović Alen	OŠ Gornje Prekounje-Ripoč	10	9	1	2	0	22
6	Kadić Benjamin	OŠ Musa Ćazim Ćatić	10	0	0	2	10	22
8	Ahmetović Zerina	OŠ Pazar	4	10	5	1	0	20
9	Hatić Vedad	OŠ Vrhbosna Sarajevo	7	0	0	2	10	19
10	Čalkić Ahmed	OŠ Vladimir Nazor	10	8	0	0	0	18
10	Jašarević Edis	OŠ Mehurići Travnik	10	0	0	0	8	18
12	Babić Azra	OŠ Safvet-beg Bašagić Visoko	10	5	0	2	0	17
13	Hodžić Haris	OŠ 6.mart Hadžići	10	0	1	2	3	16
14	Mešanović Mak	OŠ Isak Samokovlja	10	1	0	1	3	15
15	Bataković Edvin	OŠ Sead Čehić	10	2	0	2	0	14
16	Šabanović Hatidža	OŠ Travnik	10	0	1	2	0	13
16	Džajić Nedim	Prva osnovna škola Konjic	10	0	2	1	0	13
16	Pilipović Mersid	OŠ Isak Samokovlja	10	0	1	2	0	13
16	Nuhić Anis	OŠ Lukavac Grad	1	6	1	2	3	13
20	Hadžić Larisa	Druga osnovna škola Bugojno	7,5	3	1	1	0	12,5
21	Jahić Amina	OŠ Pazar	10	1	1	0	0	12
21	Djedović Ema	OŠ Kreka	10	0	0	2	0	12
21	Omanović Adna	OŠ Musa Ćazim Ćatić	10	0	1	1	0	12
24	Fazlić Asija	Peta osnovna škola Sarajevo	4,5	4	0	2	1	11,5
25	Trkić Ahmed	OŠ Gornji Vakuf	10	0	1	0	0	11
25	Goralija Hanka	OŠ Mula Mustafa Bašeskija Visoko	9	0	1	1	0	11
25	Alibašić Dalila	OŠ 25. novembar	0	9	1	1	0	11
28	Đidelija Armin	OŠ Mujaga Komadina	3,5	0	0	2	5	10,5
29	Rustempašić Nur	Treća osnovna škola Bugojno	0	5	2	2	0	9
29	Gutić Nejra	OŠ Lukavac Grad	1	5	1	2	0	9
31	Imamović Tarik	OŠ Vitez	1,5	5	0	1	0	7,5
31	Serdarević Hatidža	OŠ Safvet-beg Bašagić	1,5	5	0	1	0	7,5
33	Tipura Lamija	OŠ Suljo Čilić	1	4	0	2	0	7
33	Gibić Abdullah Ali	Osma osnovna škola "Amer Ćenanović"	1	5	0	1	0	7
35	Pajalić Merima	OŠ Konjodor Bužim	3	0	1	2	0	6
36	Imamović Faruk	OŠ Zahid Baručija	0	0	0	2	3	5
36	Ibrišević Ema	OŠ Đulistan	1	1	0	0	3	5
38	Rahmanović Tarik	OŠ Osman Nakaš	1	0,5	1	2	0	4,5
38	Zirić Haris	OŠ Harmani I	0,5	1	0	0	3	4,5
40	Hadžikadunić Fatima	OŠ 1. mart Tešanj	1	1	1	1	0	4
40	Dedić Elma	OŠ Čamil Sijarić Nemila	1	0	1	2	0	4
42	Avdukić Hana	OŠ Safvet-beg Bašagić Breza	0,5	0	1	2	0	3,5
43	Paradžik Dajana	OŠ Čengić Vila 1	0,5	0	0	2	0	2,5
43	Karić Kemal	OŠ Musa Ćazim Ćatić	0,5	0	1	1	0	2,5
45	Hasović Mirza	OŠ Osman Nakaš	0	0	1	1	0	2
45	Tufo Merim	OŠ 9.maj Pazarić	1	0	0	1	0	2
47	Turković Amina	OŠ Husein ef. Đozo	0	0	0	1	0	1
47	Karkelja Ena	OŠ Zahid Baručija	0	0	0	1	0	1

Konačni rezultati za IX/9 i VIII/8 razred

Plasman	Prezime i ime	Šifra	1	2	3	4	5	Suma
1	Tahirović Faik	OŠ Grbavica II Sarajevo	7	10	1	8	1	27
2	Omić Ferid	Prva osnovna škola Zavidovići	10	9	6	0	0	25
3	Biogradlija Lamija	OŠ Edhem Mulabdić Zenica	8	10	1	4	0	23
4	Mujkić Amila	OŠ Safvet-beg Bašagić N. Travnik	10	10	1	0	0	21
4	Beganović Tarik	OŠ Cazin II Cazin	10	10	1	0	0	21
6	Spahić Imran	OŠ Travnik Travnik	8	10	2	0	0	20
6	Osmanović Sara	OŠ Sv. Franjo Tuzla	8	7	1	0	4	20
8	Berkovac Tarik	OŠ Olovo Olovo	7	1	8	0	3	19
8	Gjocaj Hana	Prva osnovna škola V. Kladuša	10	1	8	0	0	19
8	Kavazović Muhibija	OŠ Tušanj Tuzla	8	10	1	0	0	19
8	Hadžić Lejla	Prva osnovna škola V. Kladuša	10	8	1	0	0	19
8	Pehar Mak	OŠ Novi Grad Tuzla	8	7	0	4	0	19
13	Salkić Kenan	OŠ Tušanj Tuzla	8	9	1	0	0	18
13	Efendić Nura	OŠ Tušanj Tuzla	8	10	0	0	0	18
13	Mulaimović Emin	OŠ Travnik Travnik	8	10	0	0	0	18
16	Ćatić Hana	OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo	0	10	1	0	5	16
16	Čolaković Vedad	OŠ Zahid Baručija Vogošća	1	10	2	0	3	16
18	Hrkić Maida	Prva osnovna škola Zavidovići	1	7	0	7	0	15
19	Vojić Elma	Kulen-Vakuf Orašac Bihać	2	10	1	0	0	13
20	Kaknjo Edina	OŠ Meša Selimović Zenica	0	10	1	0	1	12
20	Terzić Dženana	OŠ Kovačići Sarajevo	2	9	1	0	0	12
22	Ljubović Adna	OŠ Edhem Mulabdić Sarajevo	1	10	0	0	0	11
22	Bobić Nail	Druga osnovna škola B. Krupa	1	9	1	0	0	11
24	Ibršimović Nafija	OŠ Đulistan Lješevo Ilijaš	8	1	1	0	0	10
24	Dizdarević Abdullah	OŠ Meša Selimović Zenica	7	2	1	0	0	10
26	Fišek Hamza	OŠ Đulistan Lješevo Ilijaš	7	1	1	0	0	9
26	Ibrahimović Džejla	OŠ Orahovica Gračanica	8	1	0	0	0	9
28	Mulanović Selman	OŠ Mehurići Travnik	8	0	0	0	0	8
28	Dadić Eldar	Treća osnovna škola Bugojno	8	0	0	0	0	8
30	Podanović Elvedin	OŠ Poljice Lukavac	1	1	0	0	5	7
31	Jahić Medina	OŠ Džakule Gračanica	2	1	1	0	0	4
31	Perla Ismihana	OŠ Husein ef. Đozo Goražde	2	1	1	0	0	4
33	Bajrović Bakir	OŠ Isak Samokovlija Sarajevo	1	1	1	0	0	3
33	Tikveša Medina	Prva osnovna škola Stolac	1	1	1	0	0	3
35	Žuga Lejla	OŠ Husein ef. Đozo Goražde	1	0	1	0	0	2
36	Dedović Nejra	OŠ Amer Čenanović Sarajevo	0	0	1	0	0	1
36	Tutić Ema	OŠ Husein ef. Đozo Goražde	1	0	0	0	0	1